


Prévalence du VIH au Togo : résultats de l'EDST-III 2013-2014

Au cours de l'Enquête Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) de 2013-2014, un test de VIH a été réalisé auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Les résultats montrent que 2,5 % des femmes et des hommes de 15-49 ans sont infectés par le VIH.

Prévalence du VIH selon le milieu de résidence

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont séropositifs

■ Togo ■ Urbain ■ Rural




La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes (3,1 %) que chez les hommes (1,7 %). Elle est plus faible parmi ceux vivant en milieu rural (1,6 %) qu'en milieu urbain (3,6 %).

Prévalence du VIH selon l'âge

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont séropositifs


■ Femmes ■ Hommes



Le taux d'infection des femmes et des hommes atteint un maximum 6,3 % chez les femmes de 30-34 ans et de 6,3 % chez les hommes de 45-49 ans.

Prévalence du VIH chez les femmes par région


Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont séropositives



Chez les femmes, la prévalence est la plus élevée dans l'agglomération de Lomé (4,4 %) et elle est la plus faible dans la région des Savanes (0,4 %).

Prévalence du VIH chez les hommes par région

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont séropositifs




Chez les hommes, la prévalence est la plus élevée dans la région Maritime (2,3 %) et elle est la plus faible dans la région des Savanes (0,4 %).

Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont séropositifs

■ Femmes ■ Hommes




Chez les femmes, la prévalence du VIH augmente légèrement avec le niveau d'instruction. Chez les hommes, il n'y a pas de tendance claire entre le niveau d'instruction et la prévalence du VIH.

16 % de femmes et 12 % d'hommes ont réalisé le test du VIH au cours des 12 derniers mois et en connaissent le résultat.

Prévalence du VIH selon le statut matrimonial

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont séropositifs

■ Femmes ■ Hommes



La prévalence est plus élevée parmi les veuves (13,3 %) et les divorcées (9,2 %) et elle est plus faible parmi les femmes et les hommes célibataires (respectivement 1,0 % et 0,4 %).



Enquête Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) 2013-2014




Prévalence du VIH

Prévalence du VIH selon le quintile de bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont séropositifs

■ Femmes ■ Hommes



Chez les femmes, la prévalence du VIH tend à augmenter quand le niveau du bien-être économique augmente. Elle ne varie que très peu chez les hommes.

Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans selon le milieu de résidence

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans qui sont séropositifs

■ Togo ■ Urbain ■ Rural



La prévalence du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans est de 0,6 %. Le taux d'infection est plus élevé parmi les jeunes femmes vivant en milieu urbain (1,3 %).

Taux de réponse et méthodologie : Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues à partir d'un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées après consentement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Près de 96 % de femmes et 93 % d'hommes ont été testés. Dans l'ensemble, 94 % des 9 723 enquêtés ont été testés.



Pour tous renseignements concernant l'EDST-III 2013-2014, contacter:

Au Togo :

La Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale,
15, Rue de la KOZAH, Immeuble CENETI,
B.P. 118 Lomé TOGO
Téléphone : (228) 22-21-62-24 / (228) 22-21-22-87 ;
E-mail : dgscn_tg@yahoo.fr ; site web : www.stat-togo.org

Aux États-Unis :

The DHS Program
530 Gaither Road, Suite 500
Rockville, MD 20580 USA
Téléphone : 301-407-6500, Fax : 301-407-6501
Internet : www.DHSprogram.com

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) a été réalisée sur le terrain de novembre 2013 à avril 2014 par la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) du Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé. L'EDST-III a été financée par le Gouvernement Togolais et les partenaires financiers tels que l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le Fonds Mondial a financé l'achat des médicaments pour le traitement du paludisme. D'autres institutions ont également apporté leur expertise à la réalisation de cette opération. Parmi ces institutions figurent notamment l'Unité de Recherche Démographique (URD) pour l'appui méthodologique, le laboratoire de l'Institut National d'Hygiène (INH) pour la réalisation des tests biologiques, le Laboratoire National de Référence (LNR) du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) pour le contrôle de qualité externe des tests de parasitémie palustre, et le laboratoire du Centre National de Référence du VIH (CNR/VIH) pour le contrôle de qualité externe des tests du VIH. ICF International a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du Programme des Enquêtes Démographiques et de Santé (The DHS Program), financé par l'USAID, et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

