

Qu'est-ce que l'enquête MICS ?

L'enquête par grappe à indicateurs multiples MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) est un programme international d'enquête auprès des ménages élaboré par l'UNICEF. L'enquête MICS fournit des informations actualisées sur la situation des enfants, des femmes et des hommes et mesure les indicateurs clés qui permettent aux pays de suivre les progrès dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et des autres engagements convenus au plan international.

L'enquête MICS4 du Togo a été réalisée dans le cadre de la quatrième édition mondiale des enquêtes MICS par la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN). Les précédentes enquêtes MICS au Togo ont été réalisées en 2006, 2000 et 1995.

Echantillonnage et opération de collecte

L'opération de collecte a commencé le 6 Septembre 2010 et a pris fin le 5 Novembre 2010. Un total de 6 039 ménages ont été interviewés par une centaine d'agents déployés sur le terrain.


Ces ménages ont été sélectionnés dans 465 zones de dénombrement (ZD) définies selon la base de sondage issue de la cartographie du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2010.

Les données collectées sont représentatives au niveau national, au niveau du milieu de résidence (urbain et rural) et au niveau des cinq régions du pays et de la ville de Lomé. Elles sont aussi désagrégées par sexe et par quintile de bien-être des ménages afin de permettre une analyse des disparités socio-économiques ou de genre.

Outils d'enquête et données collectées

Les outils d'enquête MICS ont été développés par l'UNICEF après consultation d'experts reconnus venant des diverses organisations de l'ONU, aussi bien que de groupes de suivi inter-agences. Les questionnaires d'enquête sont des outils modulables qui peuvent être adaptés aux besoins de chaque pays.

Les données collectées par le MICS4 du Togo concernent notamment: la mortalité infantile et infanto-juvénile, les aspects relatifs à la santé de la mère et de l'enfant, y compris les soins prénatals, l'accès à l'eau et l'assainissement, la nutrition et la santé de la reproduction, le développement du jeune enfant, les aspects relatifs à la scolarisation de l'enfant au primaire et au secondaire, l'alphabétisation, la protection de l'enfant (enregistrement à la naissance, travail des enfants, méthodes de disciplines violentes, mariage précoce, etc.), la prévention et le dépistage du VIH-SIDA chez les hommes et les femmes.



République Togolaise



Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS4) 2010

Ministère auprès du Président de la République,
chargé de la Planification, du Développement
et de l'Aménagement du Territoire

Direction Générale de la Statistique
et de la Comptabilité Nationale (DGSCN)





TOGO	Sexe		Quintile de Bien-être économique		Milieu de résidence		Région						
	Masculin	Féminin	Le plus pauvre	Le plus riche	Urbain	Rural	Savanes	Kara	Centrale	Plateaux	Maritime sans Lomé	Lomé	
MORTALITE DES ENFANTS													
Taux de mortalité infantile (%)	78,0	84,0	72,0	92,0	56,0	66,0	83,0	89,0	102,0	81,0	72,0	66,0	69,0
Taux de mortalité infanto-juvénile (%)	124,0	131,0	117,0	149,0	85,0	102,0	134,0	144,0	167,0	129,0	113,0	102,0	109,0
NUTRITION													
Insuffisance pondérale ou rapport poids/âge (%)	16,6	18,5	14,5	21,0	8,8	10,4	19,5	30,5	17,8	19,0	11,4	13,7	10,3
Retard de croissance ou rapport taille/âge (%)	29,7	31,5	27,9	39,6	12,9	17,8	35,4	43,0	33,7	37,3	28,2	24,3	15,6
Émaciation ou rapport poids/taille (%)	4,8	5,9	3,6	5,6	4,6	4,4	5,0	7,5	5,8	5,3	3,5	3,4	5,3
Enfants de moins de 6 mois allaités exclusivement au sein (%)	62,4	62,6	62,2	55,4	69,6	67,1	60,3	67,4	59,2	65,2	50,8	67,8	71,8
Complément en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans (%)	88,1	87,6	88,6	84,0	90,6	89,3	87,5	89,7	90,0	88,9	90,1	84,9	86,6
Ménages consommant du sel iodé (%)	31,5			25,9	39,7	36,0	28,2	13,0	25,2	34,4	39,7	29,3	38,9
SANTE DE L'ENFANT													
Couverture vaccinale contre la rougeole (%)	68,3	68,6	67,9	52,9	82,8	77,7	64,2	80,3	72,9	67,8	61,6	60,9	76,4
Enfants de 12-23 mois complètement vaccinés (%)	43,7	42,5	44,9	31,7	43,8	46,4	42,5	65,4	48,6	43,5	41,0	36,0	31,4
Enfants de 12-23 mois n'ayant reçu aucun vaccin (%)	3,8	2,5	5,2	9,0	0,6	1,3	4,9	2,2	4,6	1,0	5,7	5,1	0,8
Enfants de moins de 5 ans ayant eu la fièvre et traités suivant le protocole national (combinaison artemesine) (%)	9,5	10,6	8,3	4,0	16,5	11,4	9,0	10,8	8,7	14,4	10,2	7,2	7,6
Ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée (MI) (%)	56,7			56,2	54,4	50,0	61,5	79,7	66,0	63,8	56,9	50,6	43,1
Enfants de moins de cinq ans ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée dans les ménages ayant une moustiquaire (%)	74,7	74,9	74,4	76	70,5	71,9	75,9	84,1	77	78,8	76,2	65,7	71,5
Femmes enceintes ayant reçu un traitement préventif intermittent du paludisme (%)	50,2			52,3	52,0	49,8	50,5	65,0	44,5	47,5	53,2	50,5	46,6
Enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée et reçu une thérapie par réhydratation orale avec poursuite d'alimentation (%)	23,6	22,6	24,8	20,4	15,2	22,6	23,9	30,8	26,8	28,0	13,0	25,0	22,4
EAU ET ASSAINISSEMENT													
Ménages utilisant des sources d'eau améliorées (%)	57,3			19,0	93,9	88,5	38,5	42,9	60,7	62,4	35,4	61,3	92,8
Ménages utilisant des sanitaires améliorés (%)	34,9			0,6	93,4	73,1	11,8	12,9	14,5	26,1	15,6	47,4	87,6
EDUCATION													
Taux net de fréquentation dans le primaire (%)	88,7	90,7	86,6	80,0	96,2	94,3	86,3	80,8	88,6	89,1	87,6	92,4	93,8
Indice de parité entre les sexes (IPS) à l'école primaire (ratio)	1,0			0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
Taux d'alphabétisation chez les jeunes femmes de 15-24 ans (%)	59,3			33,0	71,7	73,1	45,8	30,8	57,1	57,4	58,0	64,7	80,8
Taux d'alphabétisation chez les jeunes hommes de 15-24 ans	80,0			56,3	97,0	93,1	67,7	69,8	83,4	77,0	68,2	86,9	86,9
PROTECTION DE L'ENFANCE													
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil (%)	77,9	77,7	78,2	58,6	97,2	93,3	70,6	77,8	68,0	77,5	67,9	85,0	93,0
Enfants impliqués dans le travail des enfants (%)	46,6	44,2	49,1	57,1	26,2	31,1	53,7	42,5	50,3	49,3	55,2	46,7	24,4
Jeunes femmes âgées de 15-19 ans actuellement mariées ou en union	11,5			22,6	6,4	7,2	15,5	14,2	16,7	9,2	8,7	11,1	10,2
Enfants orphelins ayant au moins un ou les deux parents décédé (s)	9,6	9,3	9,9	8,6	10,5	11,0	8,9	9,3	10,6	8,7	7,8	10,2	11,6
SANTE DE LA REPRODUCTION													
Femmes de 15-49 ans mariées ayant un besoin non satisfait en matière de contraception (%)	37,2			39,6	30,7	34,8	38,7	37,6	32,2	36,5	40,7	36,7	37,5
Femmes de 15-49 ans mariées utilisant une méthode contraceptive moderne (%)	13,1			10,5	18,0	15,4	11,8	8,5	18,5	13,7	12,0	14,0	12,0
Femmes ayant eu au moins 4 visites prénatales ou plus (%)	54,9			36,9	79,0	79,9	46,8	42,2	49,9	51,4	50,6	60,8	74,9
Accouchement avec un personnel qualifié (%)	59,4			27,7	94,1	91,1	43,2	21,6	55,8	59,5	47,7	76,9	93,7
Femmes ayant reçu l'offre de test VIH et ayant fait le test de dépistage du VIH au cours des soins prénatals (%)	43,2			18,3	77,1	73,0	28,0	37,9	38,6	40,0	28,4	51,9	65,9
VIH/SIDA, COMPORTEMENT SEXUEL													
Femmes âgées de 15-24 ans qui ont une connaissance approfondie sur la prévention du VIH (%)	33,0			18,4	41,7	39,0	27,0	24,6	32,6	29,3	30,0	36,4	36,7
Hommes âgés de 15-24 ans qui ont une connaissance approfondie sur la prévention du VIH (%)	42,2			20,3	55,4	47,2	37,6	51,7	41,7	37,6	33,0	41,7	51,1
Femmes 15-49 ans qui ont fait le test de dépistage au VIH et ont reçu le résultat (%)	10,1			2,9	18,4	15,2	5,9	3,3	11,8	7,7	6,0	12,8	14,4
Hommes 15-59 ans qui ont fait le test de dépistage au VIH et ont reçu le résultat (%)	12,0			4,4	19,8	16,9	7,6	6,3	19,1	7,9	6,8	13,0	16,7
Femmes âgées de 15-24 ans ayant utilisé le préservatif avec des partenaires occasionnels (%)	58,8			30,6	72,9	67,9	47,1	50,0	73,0	69,0	56,7	48,2	68,3
Hommes âgés de 15-24 ans ayant utilisé le préservatif avec des partenaires occasionnels (%)	67,5			43,6	85,5	81,1	53,5	63,6	82,8	80,7	37,9	71,0	78,3